



兔外周血白细胞

本细胞仅供科研实验使用

产品简介

产品名称：兔外周血白细胞

产品品牌：通蔚生物

组织来源：血液组织

产品规格：5×10⁵cells/T 25 细胞培养瓶

细胞简介

兔外周血白细胞分离自外周血; 外周血是除骨髓之外的血液, 临床上常用一些方法把骨髓中的造血干细胞释放到血液中, 再从血液中提取分离得到造血干细胞, 我们把这样得到的干细胞称为外周血干细胞, 在二十一世纪初人类开始的生命方舟计划中首次提出外周血这一新概念。白细胞是一类无色、球形、有核的血细胞。

白细胞不是一个均一的细胞群, 根据其形态、功能和来源部位可以分为三大类: 粒细胞、单核细胞和淋巴细胞, 其中粒细胞又可根据胞质中颗粒的染色性质不同, 分为中性粒细胞、嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞三种。

根据白细胞的细胞质内有无特殊颗粒, 可将其分为有粒白细胞和无粒白细胞。前者常简称为粒细胞, 根据其特殊颗粒的染色特性, 又分为中性粒细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞, 白细胞也通常被称为免疫细胞。在显微镜下可以看到, 血细胞中体积比较大、数量比较少, 具有细胞核; 其主要作用是吞噬细菌、防御疾病。



方法简介

通蔚生物实验室分离的兔外周血白细胞采用取外周血、通过密度梯度离心法制备而来制备而来，细胞总量约为 5×10^5 cells/瓶。

质量检测

通蔚生物实验室分离的兔外周血白细胞经过检测，且不含有 HIV -1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

培养信息

培养基：含 FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin 等

换液频率：每 2-3 天换液一次

生长特性：悬浮

细胞形态：圆形

传代特性：不增殖；不传代

传代比例：不传代

消化液：0.25% 胰蛋白酶

培养条件：气相：空气，95%；CO₂，5%

兔外周血白细胞体外培养周期有限；建议使用通蔚生物配套的专用生长培养基及正确的操作方法来培养，以此保证该细胞的最佳培养状态。

细胞培养状态

发货时发送细胞电子版照片

使用方法

兔外周血白细胞是一种悬浮细胞，细胞形态呈圆形，在通蔚生物技术部标准操作流程下



，细胞不增殖；不传代；建议您收到细胞后尽快进行相关实验。

客户收到细胞后，请按照以下方法进行操作。

1. 取出 T 25 细胞培养瓶，用 75% 酒精消毒瓶身，拆下封口膜，放入 37°C、5% C O 2、饱和湿度的细胞培养箱中静置 3-4h，以稳定细胞状态。
2. 贴壁细胞消化
 - 1) 收集 T25 细胞培养瓶中的培养基于 50ml 离心管中，用 PBS 清洗细胞培养瓶 1-2 次，收集清洗液。
 - 2) 1200-1500rpm 离心 3min，弃上清，收集细胞沉淀。
 - 3) 加入 5ml 新鲜完全培养基，用吸管轻轻吹打混匀、分散细胞；将分散好的细胞调整合适密度接种至培养器皿中，置于 37°C、5% C O 2、饱和湿度的细胞培养箱中静置培养。
 - 4) 若遇到悬浮细胞团块较大，无法机械吹散时，向步骤 2)中细胞沉淀添加 0.25% 胰蛋白酶消化液 2m L 至离心管中，用吸-管轻轻吹打混匀，37°C 温浴 2-3min，消化结束后，加入胰酶抑制剂(或血清)终止消化，用吸管轻轻吹打，分散细胞；1200rpm 离心 5min，弃上清，收集细胞沉淀。
 - 5) 加入 5ml 新鲜完全培养基，用吸管轻轻吹打混匀；按传代比例进行接种传代，然后补充新鲜的完全培养基至 5m L，置于 37°C、5% C O 2、饱和湿度的细胞培养箱中静置培养。
 - 6) 待细胞状态稳定后，培养观察；之后按照换液频率更换新鲜的完全培养基。

注意事项

1. 培养基于 4°C 条件下可保存 3-6 个月。
2. 在细胞培养过程中，请注意保持无菌操作。
3. 传代培养过程中，胰酶消化时间不宜过长，否则会影响细胞贴壁及其生长状态。



4. 建议客户收到细胞后前 3 天每个倍数各拍几张细胞照片，记录细胞状态，便于和通蔚生物技术部沟通。由于运输的原因，个别敏感细胞会出现不稳定的情况，请及时和我们联系，详尽告知细胞的具体情况，以便我们的技术人员跟踪、回访直至问题得到解决。

官网网址 : www.tw-reagent.com

订购热线 : 021 - 54845833

咨询 QQ : 2881498548

咨询电话 : 15800441009(微信同号)