



## 敲低 ZNF32-DLD 细胞稳转株

### 细胞基本信息

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 名称      | <b>敲低 ZNF32-DLD 细胞稳转株</b>                               |  |
| 品牌      | 通蔚生物  |  |
| 货号      | TW-CC3689   |  |
| 英文      | 敲低 ZNF32-DLD 细胞   |  |
| 规格      | 1*10 <sup>6</sup>                                       |  |
| 冻存      | 液氮冻存  |  |
| 干冰运输    | 2ml 冻存管   |  |
| 活细胞运输   | T25 瓶   |  |
| 培养基     | 冻存液基础培养基+20%FBS+10%DMSO                                 |  |
| 存接收后处理  | 干冰运输，收到细胞后立即转入-80℃冰箱短暂中转或直接复苏                           |  |
|         | 收到细胞后，发现干冰已经完全挥发、冻存管瓶盖破裂脱落,请立即拍照与我们联系                   |  |
| 发货方式    | 复苏发货（免运输费用）/ 冻存发货（需加干冰运输费用）                             |  |
| 供应范围    | 仅限于科研实验使用，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用                           |  |
| 特别说明    | 细胞购买/细胞培养/动物血清/实验服务/原代提取/菌株购买，请立即与通蔚生物联系                |  |
| 复苏接收后处理 | 收到细胞后，请首先检查培养瓶是否破损或漏液，培养液是否混浊                           | 如有漏液及培养液混浊情况请立即拍照把图片发给我们                 |
|         | 75%酒精消毒瓶身后放培养箱中静置 4-6h 后，在显微镜下确认细胞状态并拍照 100 倍和 200 倍的照片 | 若有贴壁细胞脱落，可收集上清离心，将沉淀用新的培养基接种至新的培养瓶或培养皿中。 |
|         | 建议收到当天不要消化处理，如果细胞长满 90%，可选择传代处理                         |  |
|         | 您收到细胞 3 天内没有反馈相关问题，出现的细胞问题将不提供免费重发服务                    |  |



## 细胞培养操作及注意事项

|   |
|---|
| <b>1、细胞传代：细胞密度达到 80-90%时即可传代</b>  |
| ① 弃去培养上清，用 PBS 或生理盐水清洗 1-2 次。   |
| ② 加入 2ml0.25%胰酶 (T25 瓶)，使胰酶覆盖整个瓶或皿，盖好放入培养箱消化。   |
| ③ 1-2min 后，显微镜下观察细胞，若大部分细胞回缩且有少量细胞脱落，轻轻吹打下确认消化情况后加入完全培养基终止消化；若细胞还是贴壁，放回培养箱继续消化至可以轻轻吹打下为止。 |
| ④ 将细胞悬液 1000RPM 左右条件下离心 4min，弃上清。   |
| ⑤ 用新鲜培养基重悬后加入培养瓶或皿中，T25 培养瓶加 6-8ml 培养基。   |
| ⑥ 悬浮细胞直接离心收集，细胞沉淀重悬后分到新培养瓶中。  |
| <b>2、细胞复苏</b>   |
| ① 将冻存管在 37°C 温水中快速摇晃融化，时间 1min 左右，加入 4-5ml 培养基混匀。   |
| ② 在 1000RPM 左右条件下离心 4min，弃上清，加 1-2ml 培养基吹匀，将细胞悬液加入培养瓶中，补加适量培养基。                           |
| <b>3、细胞冻存：待细胞生长状态良好时进行细胞冻存保种</b>  |
| ① 弃去培养上清，用 PBS 或生理盐水清洗 1-2 次，加入 1ml 0.25%胰蛋白酶 (T25 瓶)。                                    |
| ② 1-2min 后，显微镜下观察细胞，大部分细胞回缩且有少量细胞脱落，轻轻吹打下确认消化情况后加入完全培养基终止消化。                              |
| ③ 将细胞悬液 1000RPM 左右条件下离心 4min，弃上清，加 1ml 冻存液重悬细胞。   |
| ④ 将冻存管放入程序降温盒，放入 -80°C 冰箱，4 小时后将冻存管转入液氮罐储存。   |



## 售后服务

|            |  |
|------------|--|
| 细胞予<br>重发  | 1.细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。   |
|            | 2.收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。  |
|            | 3.收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。  |
|            | 4.常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。   |
|            | 5.常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。  |
|            | 6.细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。  |
| 细胞不予<br>重发 | 1.客户操作造成细胞污染，不重发。  |
|            | 2.客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。   |
|            | 3.非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。   |
|            | 4.细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。   |
|            | 5.细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。   |
|            | 6.收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。   |
| 特别说明       | 上海通蔚生物客户在细胞培养过程中,有任何技术问题可以拨打免费服务电话： <a href="tel:021-54845833">021-54845833</a> ,我们随时给予实验中的免费解答。 |